



Gravidez e Parto na Cadela

1

Perguntas Frequentes

A minha cadela foi coberta. Como é que sei que está grávida?

- Com 3 semanas de gestação é possível detectar a gravidez por simples palpação abdominal. A fiabilidade deste exame é baixa e em cadelas grandes ou obesas muitas vezes não é de todo possível fazer uma avaliação.
- Com 30 dias de gestação pode confirmar-se a gravidez por **ecografia** ou **teste de sangue**.
- A partir dos 45 dias de gestação é possível fazer **RX**, o que permite confirmar a gravidez e também contar o número de fetos.

Quanto tempo dura a gestação?

- Aproximadamente 2 meses (entre 58 e 63 dias).

Que cuidados tenho que ter com a minha cadela grávida?

- Uma cadela grávida deve:

- * **Fazer uma boa alimentação** (uma ração premium ou de crescimento)
- * **Estar vacinada** – os anticorpos vão passar para os filhos protegendo-os.
- * **Ser desparasitada** – os parasitas que tiver vão passar para os filhos pela placenta e pelo leite, debilitando-os.

- Não deve:

- * **Tomar medicamentos** (a menos que sejam receitados pelo veterinário)
- * **Ser sujeita a esforços exagerados.**

Quais são os sintomas que indicam que a cadela vai entrar em trabalho de parto?

- A temperatura corporal desce para 37-37,5°C
 - Normalmente recusa a comida.
 - Pode sentir-se inquieta, ofegante, começa a “fazer ninho”.
- (Estes sintomas podem aparecer até 48 h antes do parto)

Como é o desenrolar normal do parto?

- A cadela começa a ter contracções regulares cada vez mais frequentes. Pode deitar-se ou pode querer movimentar-se, ao fim de algumas horas (até 12 horas no primeiro parto) faz-se a expulsão do 1º cachorro.
- A bolsa de águas pode romper-se antes ou durante a expulsão do feto. Se não se romper por si e a





Gravidez e Parto na Cadela

2

Perguntas Frequentes

cadela não a romper ao lambar o cachorro, pode ser preciso ajudar.

- Depois do 1º cachorro nascer os restantes vão nascendo com intervalos de tempo que podem ir de alguns minutos até uma ou duas horas.
- Cada placenta é expulsa a seguir ao feto. É importante contar o número de placentas expulsas, porque a retenção placentária pode originar uma infecção do útero.

O que não é normal? Quando devo ligar ao veterinário?

- Se já houve perda de líquido amniótico ou contracções regulares e ao fim de 12 horas ainda não nasceu nenhum cachorro.
- Se ainda há fetos dentro do útero e já passaram mais de 2 h desde o nascimento do último cachorro.
- Sempre que houver hemorragias exuberantes.

Aparentemente correu tudo bem, devo levar a cadela ao veterinário?

- Deve ser feita uma **consulta pós-parto** nas **48h** seguintes para avaliar a saúde da cadela e dos recém nascidos. Pode fazer-se rx para confirmar que todos os fetos foram expulsos.

